GAMETOGENESI

**PROCESSO DI FORMAZIONE DEI
GAMETI**

SPERMATOGENESI

**PRODUZIONE DEGLI
SPERMATOZOI (TESTICOLI)**

OOGENESI

**PRODUZIONE DELLA CELLULA UOVO
(OVAIE)**

SPERMATOGENESI

GLI SPERMATOGONI SI DIVIDONO PER MITOSI DALLA PUBERTA' FINO ALLA MORTE

1:4

OVOGENESI

1:1

**GLI OOCITI PRIMARI INIZIANO LA MEIOSI
DURANTE LO SVILUPPO EMBRIONALE
ARRESTANDOSI IN PROFASE I DELLA
MEIOSI**

SE L'OOCITA SECONDARIO **NON VIENE FECONDATO, ESSO VIENE ELIMINATO CON LE MESTRUAZIONI INSIEME AL TESSUTO UTERINO**

SE, INVECE, L'OOCITA SECONDARIO **VIENE FECONDATO, ESSO COMPLETA VELOCEMENTE LA MEIOSI II, PER POCHI ISTANTI QUINDI ESISTERA' COME CELLULA UOVO PER POI FONDERSI CON LO SPERMATOZZO E DARE ORIGINE ALLO ZIGOTE DIPLOIDE**

DETERMINAZIONE DEL SESSO

I **CROMOSOMI SESSUALI (ETEROCROMOSOMI)** determinano il sesso dell'individuo

Alla meiosi:

le **FEMMINE** producono il 100% di cellule uovo con un cromosoma **X**

i **MASCHI** producono metà degli spermatozoi con il cromosoma **X** e metà con il cromosoma **Y**

50%

EMBRIOLOGIA

FECONDAZIONE (INTERNA, TUBE o OVIDOTTI)

processo in cui il gamete maschile (**spermatozoo aploide**, n) e quello femminile (**ovocita II → cellula uovo aploide**, n) fondono i propri nuclei per formare lo **ZIGOTE** diploide ($2n$)

Molti spermatozoi circondano la cellula uovo, ma **uno solo** riesce a fecondarla

REAZIONE ACROSOMIALE, che, grazie agli enzimi idrolitici dell'**ACROSOMA**, gli consente di perforare la membrana della cellula uovo

L'ingresso dello spermatozoo nella cellula uovo scatena, a livello della sua membrana, la **REAZIONE CORTICALE**

**IMPEDISCE L'INGRESSO DI
ALTRI SPERMATOZOI**

**STIMOLA IL
COMPLETAMENTO DELLA
MEIOSI**

Lo zigote inizia lo sviluppo dividendosi
ripetutamente per mitosi
(**SEGMENTAZIONE**), originando una massa
di cellule (**BLASTOMERI**) detta **MORULA**

BLASTOCISTI o BLASTULA

All'interno della morula si crea una cavità (**BLASTOCELE**) ripiena di liquido nella quale sporge una piccola massa di cellule (**NODO EMBRIONALE**)

Parete della vescicola = **trofoblasto** o **blastoderma**

La blastula o blastocisti

GASTRULA

(GASTRULAZIONE)

Differenziamento del nodo embrionale in
tre **FOGLIETTI EMBRIONALI** o
GERMINATIVI

ECTODERMA

MESODERMA

ENDODERMA

L' **ECTODERMA** darà origine a:

- 1) epidermide e annessi cutanei (capelli, unghie, gh. sudoripare e sebacee)
- 2) porzioni di organi di senso
- 3) sistema nervoso

Il **MESODERMA** darà origine a:

- 1) muscolatura
- 2) apparato urogenitale
- 3) vasi sanguigni e sangue
- 4) ossa

L' **ENDODERMA** darà origine a:

- 1) apparato respiratorio
- 2) digerente e ghiandole ad esso annesse (fegato, pancreas)
- 3) apparato urinario

ISTOLOGIA

TESSUTO = gruppo di cellule simili tra loro (forma, dimensioni, corredo proteico, origine embrionale) che svolgono una o più specifiche funzioni

TESSUTI ANIMALI → **ORGANO** → **APPARATO**

EPITELIALE

CONNETTIVO

MUSCOLARE

NERVOSO

TESSUTO EPITELIALE (EPITELIO)

costituito da cellule strettamente accostate tra loro

Il **RIVESTIMENTO** della superficie corporea (*epidermide*) o di cavità interne (*lume intestinale*)

Le **GHIANDOLE**

TESSUTO CONNETTIVO

1) Le **cellule (FIBROBLASTI)** sono ben separate le une dalle altre dalla presenza di abbondante **sostanza interposta fra di esse (SOSTANZA INTERCELLULARE o FONDAMENTALE)**

2) avvolge e si insinua tra le formazioni costituite dagli altri tessuti per sostenerli, proteggerli

NB!

SANGUE
sostanza
fondamentale è
liquida (plasma)

TESSUTI CONNETTIVI

➤ **PROPRIAMENTE
DETTI**

➤ **SPECIALIZZATI**

ADIPOSO

CARTILAGINEO

OSSEO

SANGUE

TESSUTO ADIPOSO

Cellule (**ADIPOCITI**) che accumulano grassi in forma di trigliceridi

FUNZIONI

✓ Protezione e sostegno meccanico
presente nello strato sottocutaneo (**PANNICOLO
ADIPOSO**) e nell'interstizio tra i vari organi

✓ Isolamento termico
(grazie alla bassa conducibilità termica dei grassi)

✓ Riserva di materiale energetico

TESSUTO CARTILAGINEO

Forma le **CARTILAGINI**
ed è costituito da cellule
dette **CONDROCITI**

CARTILAGINE IALINA

costituisce:

- la massima parte dello scheletro del **FETO**
- nell'**ADULTO**, le cartilagini costali, nasali, tracheali, bronchiali, buona parte della laringe e il rivestimento delle superfici articolari delle ossa
(**CARTILAGINI ARTICOLARI**)

Dalla nascita fino alla fine
dell'adolescenza, la **CARTILAGINE
IALINA** costituisce le cartilagini di
accrescimento delle ossa lunghe

TESSUTO OSSEO

Caratterizzato da notevole rigidità e durezza
Costituisce la maggior parte dello scheletro e
dei denti dei vertebrati superiori

La sua sostanza fondamentale è rappresentata
in larga parte da **SALI INORGANICI**
(**FOSFATO TRICALCICO**, sottoforma di
IDROSSIAPATITE, **CARBONATO DI**
CALCIO, **FOSFATO DI MAGNESIO**,
FLUORURO DI CALCIO)

SPUGNOSO

TRABECOLA

Costituito da **TRABECOLE** ossee che delimitano spazi detti **CAVITÀ MIDOLLARI** occupate da **MIDOLLO OSSEO**

COMPATTO

privo di cavità

sistema di **HAVERS** (o **OSTEONE**)

Un tipico osso lungo

OSSO SPUGNOSO

cavità midollari (midollo emopoietico)
Midollo rosso

OSSO COMPATTO
osteoni

CAVITÀ MIDOLLARE CENTRALE
tessuto adiposo
Midollo giallo

Le cellule dell'osso

Osteoblasto
(sintetizza
la matrice
extracellulare
dell'osso)

Osteocita
è un **ex-osteoblasto**
che, dopo aver secreto
la matrice
extracellulare, rimane
intrappolato nella lacuna
ossea e diventa una
cellula quiescente

Osteoclasto
(rimuove
la matrice ossea
per riassorbimento)

RIMODELLAMENTO OSSEO

Processi di erosione e
ricostruzione

TESSUTO MUSCOLARE

Deputato ad assicurare il movimento

STRIATO

caratterizzato da una
striatura trasversale

Nei vertebrati, il muscolo scheletrico è il
tessuto più abbondante dell'organismo

LISCIO

privo della striatura

VOLONTARIO

la cui contrazione avviene sotto il controllo del SNC

Si tratta **SEMPRE** di **TESSUTO STRIATO**

Es: muscolatura braccia e gambe, lingua bulbo oculare

INVOLONTARIO

la cui contrazione NON avviene sotto il controllo del SNC

Si tratta **QUASI SEMPRE** di **TESSUTO LISCIO**

Es: vasi, tratto gastro-intestinale, utero, vescica, diaframma

Pareti del cuore: striato

TESSUTO MUSCOLARE STRIATO

Cellule =
**FIBROCELLULE
MUSCOLARI** o
**FIBRE
MUSCOLARI**

Membrana plasmatica = **SARCOLEMMA**

Citoplasma = **SARCOPLASMA**

Reticolo endoplasmatico = **RETICOLO SARCOPLASMATICO**

L'interno della cellula è occupato da strutture filamentose, disposte nel senso della lunghezza della cellula, chiamate **MIOFIBRILLE**

Una miofibrilla è formata da:

FILAMENTI di **MIOSINA** (spessi)

FILAMENTI di **ACTINA** (sottili)

**I FILAMENTI DI ACTINA E MIOSINA SI ORGANIZZANO
NELLE MIOFIBRILLE IN UNITA' CHE SI RIPETONO
DETTE **SARCOMERI****

Le unità elementari/funzionali della contrazione

COME AVVIENE LA CONTRAZIONE

L'accorciamento/distensione del sarcomero (contrazione muscolo) avviene per

SCORRIMENTO DEI FILAMENTI SOTTILI di actina SU QUELLI SPESSI di miosina IN DIREZIONE DEL CENTRO DEL SARCOMERO

❖ **Richiede ATP**

➤ **E' attivata da Ca^{++}**

TESSUTO NERVOSO

Cellule **NEURONI**
specializzate nella
generazione e conduzione
di **SEGNALI NERVOSI**

CORPO CELLULARE

DENDRITI

conduzione centripeta

ASSONE

(CILINDRASSE)

conduzione centrifuga

CELLULE DELLA GLIA o
CELLULE GLIALI

(astrociti, oligodendrociti,
microglia)

Sostegno, protezione e nutrizione
per i neuroni

EREDITARIETÀ

EREDITARIETÀ

Trasmissione, da una generazione alle successive, dei caratteri originati dall'assetto genetico.....

GENOTIPO: costituzione genetica di un organismo

FENOTIPO: manifestazione visibile o in qualche modo evidenziabile di un carattere genetico.

E' determinato dal **GENOTIPO**.....

..... e dall'azione di altri geni e dei loro prodotti e dalla sua interazione con l'ambiente

Aploide/diploide

Cellula diploide, $2n$
Tre coppie di cromosomi omologhi

Cellula aploide, n
Un solo cromosoma per ogni coppia

- Una cellula che contiene 2 cromosomi di ogni tipo è **diploide**: le cellule somatiche sono diploidi

- Una cellula in cui è presente un cromosoma per ogni coppia di omologhi è **aploide**: i gameti sono aploidi

CROMOSOMI OMOLOGHI: I MEMBRI DI UN PAIO DI CROMOSOMI, SIMILI NELLA DISPOSIZIONE DEI GENI PRESENTI E NELLA LORO STRUTTURA. SI APPAIONO ALLA MEIOSI

ALLELI

Geni che occupano *loci* (al singolare: *locus*) corrispondenti in cromosomi omologhi

Determinano lo stesso carattere

Gli alleli di un gene possono risultare uguali o diversi; se sono diversi, essi rappresentano forme alternative per il carattere che concorrono a determinare. In questo caso il carattere fenotipico che essi codificano dipende dalla maggiore forza espressiva dell'uno o dell'altro allele (CONCETTO DI **DOMINANZA** o **RECESSIVITÀ**)

LOCI

GENE

Eye colour gene

TRAIT

Brown

Hair colour gene

Hazel

Se i due alleli di uno stesso gene sono uguali, l'individuo è detto **OMOZIGOTE**

Se "A" o "a" sono i geni, allora il suo genotipo si indica con "AA" o "aa"

A = dominante; a = recessivo → AA = **OMOZIGOTE DOMINANTE**

aa = **OMOZIGOTE RECESSIVO**

Se i due alleli di uno stesso gene sono diversi, l'individuo è detto **ETEROZIGOTE**

(**IBRIDO**) Se "A" o "a" sono i geni → il suo genotipo si indica con "Aa"

**UN SOLO
CARATTERE**

UN INDIVIDUO OMOZIGOTE:
GENOTIPO BB: solo gameti B (100%)
GENOTIPO bb: solo gameti b (100%)

UN INDIVIDUO ETEROZIGOTE:
GENOTIPO Bb: 50% gameti B
50% gameti b

In genetica, l'accoppiamento tra due individui è detto incrocio ed è rappresentato con il simbolo “x”

GENOTIPO BB

100% gameti B

INCROCI

Genotipi parentali **Aa** x **Aa**

Gameti

Genotipi della progenie

AA **Aa, Aa** **aa**

25% **50%** **25%**

1/4 **1/2** **1/4**

Fenotipi della progenie

75% dominante A, **25%** recessivo a

3/4 dominante A, **1/4** recessivo a

DUE CARATTERI SU CROMOSOMI DIVERSI

SE I DUE ALLELI DI UNO STESSO GENE SONO DIVERSI, L'INDIVIDUO E' DETTO **ETEROZIGOTE**
SsBb = DOPPIO ETEROZIGOTE o **DIIBRIDO**

UN INDIVIDUO ETEROZIGOTE PRODUCE I SEGUENTI GAMETI:

SsBb: SB, Sb, sB, sb

25% 25% 25% 25%

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$

1:1:1:1

SE I DUE ALLELI DI UNO STESSO GENE SONO UGUALI, L'INDIVIDUO E' DETTO **OMOZIGOTE**
SSBB = OMOZIGOTE DOMINANTE
ssbb = OMOZIGOTE RECESSIVO

UN INDIVIDUO OMOZIGOTE PRODUCE UN SOLO TIPO DI GAMETI RELATIVAMENTE A QUEL LOCUS

SSBB: solo gameti SB (100%)

ssbb: solo gameti sb (100%)

METAFASE I

METAFASE II

BS

BS

bs

bs

METAFASE
I

METAFASE
II

bs

BS

bS

Bs

Esempi di INCROCIO

Genotipi parentali
Gameti
Genotipi progenie
Fenotipo

AABB x aabb
AB x ab
AaBb (100%)
dominante (AB) (100%)

LEGGI DI MENDEL

(metà Ottocento)

LEGGI CHE GOVERNANO LA
TRASMISSIONE EREDITARIA DEI
CARATTERI MONOFATTORIALI
controllati da un singolo gene
(*caratteri mendeliani semplici*)

LEGGE DELL'UNIFORMITÀ DEGLI IBRIDI

L'incrocio tra individui della **GENERAZIONE PARENTALE (P)**, ciascuno omozigote per due alleli diversi di uno stesso gene (es. AA x aa) e che quindi differisce dall'altro genitore per una caratteristica (pelo nero o bianco), dà una progenie (**F₁** o **PRIMA GENERAZIONE FILIALE**) costituita da individui tutti identici tra loro (tutti eterozigoti, Aa)

Ciascun genitore della P è una **linea pura** (è **omozigote** per quel carattere), un insieme di individui il cui incrocio dà origine ad individui sempre con lo stesso carattere dei genitori

LEGGE DELLA SEGREGAZIONE

L'incrocio tra individui eterozigoti ($Aa \times Aa$) dà una progenie (detta **SECONDA GENERAZIONE FILIALE** o F_2) in cui compaiono genotipi diversi in rapporti genotipici definiti e costanti ($\frac{1}{4} AA$, $\frac{1}{2} Aa$, $\frac{1}{4} aa$)

Le coppie di alleli di un gene si separano (segregano) l'uno dall'altro durante la formazione dei gameti

Fenotipi in rapporto 3:1

LEGGE DELL'ASSORTIMENTO INDIPENDENTE

Nell'incrocio tra individui che differiscono per due caratteri controllati ciascuno da coppie alleliche localizzate su cromosomi diversi, le due coppie di alleli si assortiscono indipendentemente

Maschio nero Femmina bianca

Gli alleli di un gene si separano in maniera indipendente dagli alleli di un altro gene durante la formazione dei gameti

Fenotipi in rapporto 9:3:3:1

Fenotipi in rapporto 3:1

NL:BL (9:3)

NC:BC (3:1)

NL:NC (9:3)

BL:BC (3:1)

GENETICA UMANA

L'ANALISI GENETICA FORMALE DELL'UOMO VIENE FATTA RICOSTRUCENDO A RITROSO LA STORIA DELLA FAMIGLIA (RACCOGLIENDO **DATI FENOTIPICI**) IN CUI COMPARE IL CARATTERE IN ESAME

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI TUTTI I MEMBRI CON OPPORTUNI SIMBOLI

TRASMISSIONE DEI CARATTERI MONOFATTORIALI

EREDITÀ **AUTOSOMICA** **DOMINANTE**

Il carattere **patologico** (responsabile della malattia) è localizzato in un cromosoma **autosomico** e l'allele patologico è dominante (A), mentre l'allele sano è recessivo (a)

Genotipo del soggetto **malato**: AA o Aa

Genotipo del soggetto **sano**: aa

ESEMPI DI MALATTIE AUTOSOMICHE DOMINANTI NELL'UOMO

Nanismo acondroplastico

Corea o malattia di Huntington
(malattia neurodegenerativa, disturbi del movimento, della coordinazione, del linguaggio, dell'apprendimento, della memoria
→ completa demenza)

Sindrome di Marfan
(rara malattia ereditaria del tessuto connettivo che causa alterazioni oculari, ossee, cardiache, dei vasi sanguigni, polmonari e del sistema nervoso centrale)

TRASMISSIONE DEI CARATTERI MONOFATTORIALI

EREDITÀ AUTOSOMICA RECESSIVA

Il carattere **patologico** (responsabile della malattia) è localizzato in un cromosoma **autosomico** e l'allele patologico è recessivo (a), mentre l'allele sano è dominante (A)

Genotipo del soggetto **malato**: aa

Genotipo del soggetto **sano**: AA o Aa
(portatore sano)

ESEMPI DI MALATTIE AUTOSOMICHE RECESSIVE NELL'UOMO

Albinismo

(incapacità di sintetizzare
la melanina)

Fibrosi cistica o mucoviscidosi

Anemia falciforme

(alterazione della catena beta dell' Hb
Globuli rossi a falce)

EREDITÀ LEGATA AL SESSO

GENI LOCALIZZATI SUI CROMOSOMI
SESSUALI

EREDITÀ LEGATA AD Y

Geni localizzati sul cromosoma Y

TRASMISSIONE OLOANDRICA

(dal **padre** al **figlio maschio**)

EREDITÀ LEGATA AD X

Geni localizzati sul cromosoma X

(geni X-linked)

Una femmina (**XX**) per un gene localizzato su X potrà presentare tre genotipi:

omozigote dominante $X^A X^A$
omozigote recessivo $X^a X^a$
eterozigote $X^A X^a$

Un maschio (**XY**) possiede solo un cromosoma X
→ potrà avere solo due genotipi: $X^A Y$ o $X^a Y$

CONSEGUENZE:

- 1) il maschio manifesterà **SEMPRE** l'unico allele presente sul suo cromosoma X, sia che esso sia dominante che recessivo
- 2) Il carattere si manifesterà nei maschi con frequenza maggiore rispetto alle femmine

EREDITÀ LEGATA AD X

Geni **recessivi** associati all' X

LA TRASMISSIONE DELLA
MALATTIA AVVIENE DAL
NONNO A META' DEI NIPOTI
MASCHI ATTRAVERSO LE FIGLIE
FEMMINE PORTATRICI SANE
(ETEROZIGOTI) (**DIAGINICA** o a
ZIG-ZAG)

ESEMPI DI MALATTIE LEGATE AD X NELL'UOMO

Grave insufficienza nella coagulazione del sangue causata dalla mancanza, totale o parziale, in uno dei fattori della coagulazione del sangue

DALTONISMO

Alterata percezione dei colori

I muscoli dei pazienti affetti da questa patologia presentano aspetti degenerativi che portano gradualmente alla perdita delle normali funzionalità motorie

Eredità multifattoriale

E' quella in cui un determinato fenotipo deriva dalla interazione tra fattori genetici e fattori ambientali

MALATTIE CARDIOVASCOLARI

MALATTIE CEREBROVASCOLARI

TUMORI

OBESITA'

DIABETE

MALATTIA DI ALZHEIMER

EREDITÀ MITOCONDRIALE o CITOPLASMATICA

► **TRASMISSIONE MADRE**
→ FIGLI SIA ♂ CHE ♀

Il gruppo	Può ricevere da	Può donare a
0+	0- 0+	A+ 0+ B+ AB+
A+	A+ A- 0+ 0-	A+ AB+
B+	B+ B- 0+ 0-	B+ AB+
AB+	TUTTI	AB+
0-	0-	TUTTI
A-	A- 0-	A+ A- AB+ AB-
B-	B- 0-	B+ B- AB+ AB-
AB-	A- 0- B- AB-	AB+ AB-

Gruppo 0- = donatore universale

Gruppo AB = riceventi universale

ALLELI MULTIPLI

Quando esistono più di due alleli di un gene

es: gruppo sanguigno AB0

I_A , I_B , I_0 (i)

Ogni individuo diploide possiede solo due alleli di un gene!!

I GRUPPI SANGUIGNI DEL SISTEMA AB0

Fenotipo		Genotipo
Gruppo sanguigno	Molecola alla superficie dei globuli rossi	
A		AA oppure $A0$
B		BB oppure $B0$
AB		AB
0	(né A né B)	00

SISTEMA Rh

PRESENZA DELL' ANTIGENE Rh (Proteina D): **SOGGETTI Rh⁺**

ASSENZA DELL' ANTIGENE D o FATTORE Rh: **SOGGETTI Rh⁻**

ERITROBLASTOSI FETALE O MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO

SISTEMA Rh

Rh+ DD, Dd

Rh- dd